

宽筋藤

KuanJinTeng

本品为防己科植物中华青牛胆 *Tinospora sinensis* (Loureiro)Merrill 的干燥藤茎的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形、长椭圆形或不规则形的厚片。外表皮棕黄色或棕褐色，具明显纵皱纹，可见皮孔白色或黄白色，类圆形突起，栓皮易剥离。切面黄白色，具明显的放射状纹理，木部导管针孔状，部分中央具髓部。气微，味微苦。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄棕色。纤维多数散在或成束，纤维束周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞散在，类长方形、多角形，壁厚，孔沟及纹孔明显，有的含草酸钙方晶。淀粉粒甚多，单粒类球形、类椭圆形或不规则形，直径3~20 μm 。木栓细胞多见，类多角形，淡黄棕色。导管多为网纹导管，梯纹导管及螺纹导管少见。

(2) 取本品粉末1g，加甲醇15ml，浸泡1小时，加热回流30分钟，放冷，滤过，滤液作为供试品溶液。另取宽筋藤对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2015版四部通则0502)试验，吸取上述两种溶液各10 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸(5:4:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%磷钼酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰，在日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过13.0%(《中国药典》2015年版四部通则0832第二法)。

总灰分 不得过10.0%(《中国药典》2015年版四部通则2302)。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(《中国药典》2015年版四部通则2201)项下的热浸法测定，不得少于16.0%。

【性味与归经】 微苦，凉。归肝经。

【功能与主治】 舒筋活络，祛风止痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，屈伸不利，跌打损伤。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置通风干燥处。

祛风止痛