

青羊参（青阳参）

Qingyangshen

本品为萝藦科植物青羊参 *Cynanchum otophyllum* Schneid. 的干燥根的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

【性状】 本品为类圆形或不规则形厚片。外表皮黄褐色至棕褐色，有横皱纹及横长皮孔，表皮脱落处显黄褐色。质硬，折断时有粉尘。断面类白色，可见淡黄色点状突起（导管），断续排列成的环。气辛香，味苦，微甜。

【鉴别】（1）本品粉末淡黄色。石细胞方形、长方形、类圆形、多角形或不规则形，孔沟明显并可见增厚的层纹。草酸钙簇晶，棱角尖或钝尖。淀粉粒类球形，甚多，单粒散在，复粒由2至数粒组成，脐点点状、裂隙状、飞鸟状。具缘纹孔导管易见。韧皮纤维壁增厚，单个散在或2-10个成群。木栓细胞多角形，淡棕色。

（2）取本品粉末0.8g，加乙酸乙酯40ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取青羊参对照药材0.8g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典（2020年版）》四部通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5:1:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，在紫外光（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过13.0%（《中国药典》四部通则0832第二法）。

总灰分 不得过6.0%（《中国药典》四部通则2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法项下的冷浸法（《中国药典》四部通则2201）测定，不得少于15.0%。

【性味与归经】 辛、甘，温。归心、肝、脾经。

【功能与主治】 祛风湿，补虚羸，镇痉，拔毒。用于风湿骨痛，腰肌劳损，体虚神衰，小儿疳积、慢惊，癩痢，犬咬伤。

【用法与用量】 9~30g。犬咬伤：内服并外敷。

【注意】 忌与百草霜同用。

【贮藏】 置干燥处。

本草綱目